

CUIDADOS DE LA VACA POSTRADA

1. Prevención - entender las causas más importantes
2. Cambiar de lugar - trasladar con cuidado al área de recuperación
3. Cuidados - proporcionar refugio, agua, alimento y tratamiento

CAUSAS PRIMARIAS

- Parálisis al parto
- Mastitis/Metritis
- Fiebre de la leche
- Lesionadas

CAUSAS SECUNDARIAS

Si la vaca permanece tumbada en la misma posición por **6-12 horas**, la presión puede causar daño permanente en los nervios y músculos



RECUPERACIÓN FAVORABLE

- Diagnosticar pronto
- Tratar pronto
- Proporcionar los cuidados apropiados

Cuidados sanitarios adecuados

La recuperación va a depender de la calidad de los cuidados

El alojamiento debe proporcionar:

- ✓ Pavimentos no resbaladizos
- ✓ Cama seca, limpia, y blanda
- ✓ Protección contra las inclemencias del tiempo

Separar las vacas postradas:

- ✓ de las vacas ambulantes

Alimento y agua:

- ✓ Accesible a cada vaca

Los Cuidados sanitarios incluyen:

- ✓ Cambiar las vacas en posición lateral recumbente a una posición esternal
- ✓ Rotar de lado cada 2-3 horas para minimizar el daño en los tejidos
- ✓ Evaluar diariamente la capacidad de mantenerse en pie y soportar su peso



CANDIDATA PARA LA EUTANASIA

- Dolor severo
- Prognóstico desfavorable
- Fracturas
- Recumbencia lateral
- Postrada por más de 6-12 horas



NO TRANSPORTAR O VENDER

Las vacas postradas no deben ser arrastradas

Deben usarse los aparatos apropiados:

- ✓ Cabestrillo o arnes
- ✓ Trineo
- ✓ Cubo de la paleadora
- ✓ Abrazadera de la grupa bien acolchada; durante cortos periodos de tiempo
- ✓ Usar el tanque de flotación - 6 a 24 horas por día