


Limpieza y Desinfección para el virus virulento de la Enfermedad de Newcastle



¿Por qué es importante?

Cada área que ha tenido la enfermedad de Newcastle DEBE limpiarse Y desinfectarse. ¡La enfermedad de Newcastle puede disminuir la cantidad de huevos puestos y puede causar la muerte de su parvada!

PASO 1: Póngase ropa y zapatos / botas SOLAMENTE para ser usados para la limpieza.



PASO 2: LIMPIAR (Mojado)

Humedezca y barra la basura y la suciedad, y retire el material obviamente sucio de cualquier superficie, como polvo, tierra o excrementos, alrededor de donde estaban las aves enfermas con agua y jabón.



<https://cdn.morningchores.com/wp-content/uploads/2016/11/cleaning-chicken-coop.jpg>

PASO 3: DISPOSICION

Empaque y deseche todo el material sucio.



(<https://www.istockphoto.com/dk/vector/man-throwing-trash-bags-in-container-gm1152968862-312986271>)

PASO 4: DESINFECTAR (Mojado)

Aplique blanqueador al 10% ($\frac{1}{2}$ galón de lejía en un balde de 5 galones y llene el resto con agua) en todas las superficies y equipos con los que las aves estuvieron en contacto y áreas cercanas. Otra alternativa para hacer blanqueador al 10% es llenar una lata de refresco con lejía y agregarla a una jarra de leche de 1 galón y llenar el resto con agua.

Permita que el blanqueador repose durante al menos 15 minutos.



<https://hencam.com/henblog/2014/04/natural-coop-disinfectant/>


PASO 5:

Póngase ropa y zapatos limpios cuando termine de limpiar.

Tome las botas usadas para limpiar y frote el material sucio.

Remoje las botas en una solución de lejía durante 15 minutos.

Lave la ropa usada para limpiar de inmediato.



<https://www.farmbiosecurity.com.au/biosecurity-basics-make-your-own-footbath/>

PASO 6:

Lávese bien las manos después de manipular pájaros o limpiar su recinto.

**PASO 7:**

No traiga pájaros nuevos a su propiedad durante al menos 4 meses.



<http://www.wfav951.com/2019/08/07/chickens-yes-roosters-no-in-kankakee/>