

Instrucciones para Vacunación Viva Ocular contra el Virus de la Enfermedad de Newcastle (NDV)

Vacunas:

Compre la vacuna disponible contra NDV (cepas B1 LaSota o LaSota)

Diluyente:

Diluya en agua mineral fría fresca (sin gas). La proporción de dilución es de 0.03 ml de agua por dosis (por ejemplo, si tiene un frasco de vacuna de 1,000 dosis, necesita diluir la vacuna en 30 ml de agua mineral).

Procedimiento:

1. Abra el sello metálico del frasco de la vacuna, retire el tapón de goma y agregue agua mineral hasta que llegue a la mitad del frasco.
2. Vuelva a colocar el tapón de goma en el frasco de la vacuna y agítelo hasta que el pellet desaparezca.
3. Vierta la vacuna diluida en una botella y llenela con agua mineral hasta 30 ml (1,000 dosis) o 300 ml (10,000 dosis).
4. Agite nuevamente y vierta en una botella cuentagotas para la aplicación.

**MANTENGA LA VACUNA FRÍA EN TODO MOMENTO DESPUÉS DE LA RECONSTITUCIÓN
LA VACUNA ES EFFECTIVA SI SE APLICA HASTA 1 ½ HORAS DESPUÉS DE LA RECONSTITUCIÓN
SI ESTA FRÍA**

Aplicación:

Aplique la vacuna con el frasco cuentagotas (una gota en un ojo del pollo). Después de aplicar la gota, espere hasta que la gota desaparezca del ojo antes de soltar el ave. Si hay colorante en la vacuna, una lengua tenida será indicativa de una vacunación efectiva.

RECUERDE QUE LAS VACUNAS SE APLICAN EN UN "PROGRAMA DE VACUNACIÓN"; PARA LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE, EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN ES:

-3 DÍAS DE EDAD

-3 SEMANAS

-3 MESES (Vacuna muerta)

-CADA 6 MESES (Vacuna muerta)

Si no hay una vacuna muerta disponible, el programa se puede hacer con vacunas vivas.